



---

**FICHA TECNICA****ORGANIKAS CYTO FULL****1. GENERALIDADES**

a) Nombre comercial : ORGANIKAS CYTO FULL

b) Composición química:

| Composición Química (p/v)  |           |
|----------------------------|-----------|
| Promotores de citoquinina  | 2.00 gr/L |
| Ácido Fólico               | 0.02 gr/L |
| Ácido Nucleico             | 0.01 gr/L |
| Tiamina                    | 0.01 gr/L |
| Bioactivadores enzimáticos | 2.50gr/L  |

c) Clase de uso : Nutriente foliar fitorregulador y promotor de desarrollo.

d) Formulación : Concentrado soluble

**2. PROPIEDADES FISICO – QUIMICAS**

a) Aspecto: Líquido

b) Nombre Químico: bioestimulantes

c) Color: Café

d) Propiedades oxidativas: No oxidante

e) Explosividad: No explosivo

f) Reactividad con el material del envase: Estable

g) pH: 3.0 - 4.0

h) Densidad: 1.2 gr/ml

i) Olor: Característico a compuestos orgánicos

j) Solubilidad: 100% en agua

**3. CARACTERISTICAS PRINCIPALES**

**Cyto Full** es un fitorregulador y promotor de desarrollo vegetal que busca combinar los efectos de cada uno de los grupos hormonales y vitaminas, estimulando el desarrollo balanceado entre los órganos y tejidos de las plantas.

**Cyto Full** proporciona citoquinina natural que es crucial para el crecimiento vegetativo, el desarrollo reproductivo y la mitigación del estrés abiótico. Su interacción armónica durante el desarrollo de la planta, se traducirá en los incrementos cualitativos y cuantitativos de las cosechas y la rentabilidad de los cultivos.

**4. BENEFICIOS**

- ✓ Estimula el crecimiento en la división celular (mayor crecimiento de frutos: en tamaño y peso)
- ✓ Incrementa la viabilidad del polen en condiciones de altas temperaturas, favoreciendo la polinización de las flores bajo esas condiciones.
- ✓ Promueve el crecimiento de raíces, despierta yemas en las plantas.
- ✓ Regula el crecimiento excesivo de follaje en cultivos sometidos a altas temperaturas, rompe la dominancia apical.
- ✓ Promueve la regeneración de nuevas raíces cuando han sido afectadas por patógenos.



- ✓ Retarda la maduración prematura aumentando la vida post cosecha de los frutos.
- ✓ Retarda el envejecimiento de los tejidos vegetales aumentando la vida productiva de los cultivos.

## 5. CULTIVO, DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN

| CULTIVOS                          | MOMENTO DE APLICACIÓN                                                                                                               | DOSIS ml/200L  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Palta, Vid, Papaya, cacao         | 1° Pre floración<br>2° Inicio de cuajado<br>3° Desarrollo de frutos.                                                                | 1-1.5L/h       |
| Rocoto, tomate y pimiento         | 1° Aplicar a la aparición de botones florales.<br>2° 15 días después de la 1° aplicación.                                           | 100-150ml/200L |
| Melón, Sandía, Pepinillo, Zapallo | 1° A los 15 o 20 cm de altura de la planta<br>2° después de cada cosecha, dentro de las 48 horas.                                   | 100-150ml/200L |
| Ajo, Cebolla, Poro                | 1° Al inicio del engrosamiento del bulbo.<br>2° 10 días después de la 1°ra aplicación.<br>3° 10 días después de la 2°da aplicación. | 100-150ml/200L |
| Papa, Camote, Yuca Kion.          | 1° Aplicar antes o después del aporque.<br>2° Aplicar 3 semanas después.                                                            | 100-150ml/200L |
| Arroz                             | 1° 21 días después de la emergencia o 7 días después del trasplante.<br>2° Después de la emisión de la panícula.                    | 100-150ml/200L |
| fresas                            | 1° Aplicar al inicio de floración<br>2° 10 días después de la 1°ra aplicación.                                                      | 100-150ml/200L |

**Cyto Full**, se aplica por aspersión, disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje y también puede aplicarse con agua de riego ya sea de gravedad, goteo, micro jet o micro aspersión.

## 7. MODO DE ACCION

Las citoquininas promueven la diferenciación, división y crecimiento celular; induce la formación de yemas vegetativas y reproductivas; retarda el envejecimiento de la planta; activa la división celular y limitan la síntesis de Etileno; favorece la polinización en condiciones de altas temperaturas mayores a 30.5 °C.

## 8. COMPATIBILIDAD

**Cyto Full** es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes foliares. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación foliar para establecer la compatibilidad física de los productos, no mezclar con fertilizante quelatados o parcialmente quelatados. No mezclar con aceites minerales, productos alcalinos.

## 9. FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad cuando es usado a la dosis indicada en la etiqueta.

## 10. PRESENTACION

Envase ½ litro  
Envase x 1 litro  
Envase x 5 litros

## 12. FORMULADOR/DISTRIBUIDOR/IMPORTADOR

ACTIVEN PERU E.I.R.L.